

## Suivi de grossesse Dates à retenir

	La 1ère consultation se fait avant 15 semaines d'aménorrhée (soit 15 semaines d'absence de règles). Une déclaration de grossesse sera remplie par le professionnel ; à adresser à la caisse d'allocations familiales et de sécurité sociale.
<b>1er trimestre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Entretien prénatal précoce</li> <li>➤ Choisir un mode de préparation à la naissance et à la parentalité</li> <li>➤ Prise de sang pour le groupe sanguin, la sérologie de rubéole et de toxoplasmose</li> </ul> <p><b>Echographie de 11 à 13 semaines d'aménorrhée</b> suivie d'une prise de sang pour le dépistage de la trisomie 21 (selon demande des parents)</p>
<b>4<sup>ème</sup> mois</b>	2 <sup>ème</sup> consultation.
<b>5<sup>ème</sup> mois</b>	3 <sup>ème</sup> consultation <b>Echographie de 22 semaines d'aménorrhée</b>
<b>6<sup>ème</sup> mois</b>	4 <sup>ème</sup> consultation. Prise de sang Prendre contact avec la maternité d'accouchement
<b>7<sup>ème</sup> mois</b>	5 <sup>ème</sup> consultation. Consultation avec la maternité où vous allez accoucher.
<b>8<sup>ème</sup> mois</b>	6 <sup>ème</sup> consultation. Consultation dans la maternité d'accouchement non faite au 7 <sup>ème</sup> mois. <b>Echographie de 33 semaines d'aménorrhée</b>
<b>9<sup>ème</sup> mois</b>	7 <sup>ème</sup> consultation, dans la maternité d'accouchement. Consultation avec un médecin anesthésiste.

**A chaque examen, recherche de sucre et d'albumine dans les urines. Si la sérologie de toxoplasmose est négative, prise de sang tous les mois.**

**Des prises de sang supplémentaires, des échographies ou d'autres types d'exams peuvent être réalisées en fonction des situations.**

## Le Réseau Périnatal Alpes-Isère (RPAI)

### C'est quoi ?

Une convention entre les différentes maternités\* qui se sont engagées pour travailler ensemble afin de vous assurer le meilleur suivi pour votre grossesse. Cette convention associe également le Conseil Général de l'Isère.

### Qui est impliqué dans le réseau ?

Tous les professionnels concernés par la périnatalité à savoir : gynécologues, obstétriciens, anesthésistes, sages-femmes, pédiatres, puéricultrices, psychiatres, psychologues, mais aussi les médecins du SAMU 38, les médecins épidémiologistes, les médecins échographistes, les médecins généralistes qui suivent des grossesses, les gynécologues n'exerçant pas en maternité...

### Quel est le but ?

L'essentiel est d'organiser et coordonner les différents partenaires, au moyen, notamment, d'une harmonisation des procédures de soins afin que toute femme puisse bénéficier d'une prise en charge optimale. La mission principale du réseau étant de promouvoir la sécurité et la qualité des soins pendant la grossesse et à la naissance.

Le Réseau Périnatal Alpes-Isère s'étend sur GRENOBLE, VOIRON et leurs environs.

\* maternités : Cliniques BELLEDONNE, des CEDRES et des EAUX CLAIRES ; CHU GRENOBLE et CH VOIRON

Consultez le site web : [www.rpai-perinat.org](http://www.rpai-perinat.org)

**Vous y retrouvez, entre autres, la liste des**

**Professionnels formés à l'Entretien Périnatal Précoce**


**Avec le concours de**



Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé



**isère**  
CONSEIL GÉNÉRAL  
[www.isere.fr](http://www.isere.fr)



## Entretien Périnatal Précoce pendant la grossesse

**Les femmes enceintes peuvent bénéficier, dès le début de grossesse, ou à tout moment de la grossesse, d'un entretien individuel ou en couple avec un professionnel**

**Plaquette destinée aux professionnels de la périnatalité**